

Πίνακας 10.2. Επιπλοκές ενδοσκόπησης ανώτερου πεπτικού.

- Φαρμακευτικές αντιδράσεις (αλλεργίες, θρομβοφλεβίτιδα, καταστολή κέντρου αναπνοής)
- Καρδιοπνευμονικές επιπλοκές (πνευμονία από εισρόφηση, καρδιακές δυσρυθμίες)
- Διάτρηση (εκκόλπωμα Zenker, αποφρακτικές βλάβες, χειρουργικές αναστομώσεις, λήψη βιοψιών)
- Αιμορραγία (σπάνια)
- Ένσφηνωση ενδοσκοπίου (κυρίως σε ευμεγέθη διαφραγματοκήλη ή κατά την διενέργεια από τον ενδοσκόπο του ειδικού χειρισμού αναστροφής του ενδοσκοπίου)
- Βακτηριδαιμία, μετάδοση λοίμωξης
- Μεθαιμοσφαιριναιμία από την φαρυγγική αναισθησία (benzocaine)

- Η ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού είναι μια ασφαλής διαγνωστική μέθοδος και ασφαλέστερη ενδοσκοπική τεχνική. Αναφέρονται ποσοστά επιπλοκών 0,13% και θνητότητας 0,0004%

Πίνακας 11.2. Επιπλοκές ενδοσκόπησης κατώτερου πεπτικού.

- Επιπλοκές από την προετοιμασία
- Φαρμακευτικές αντιδράσεις (αλλεργίες, θρομβοφλεβίτιδα, καταστολή κέντρου αναπνοής)
- Καρδιοπνευμονικές επιπλοκές (πνευμονία από εισρόφηση, καρδιακές αρρυθμίες)
- Διάτρηση/πνευμοπεριτόναιο
- Αιμορραγία
- Βακτηριδαιμία, μετάδοση ηλοίμωξης
- **Σπάνιες:** Τραύμα σπλήνα, ενσφήνωση ενδοσκοπίου σε κήλη, οξεία σκωληκοειδίτιδα

- Είναι σπάνιες, αλλά μπορεί να αποβούν σοβαρές και απειλητικές για την ζωή του ασθενούς. Το ποσοστό των επιπλοκών είναι ευθέως ανάλογο της εμπειρίας του ενδοσκόπου. Η πρόληψη των επιπλοκών προϋποθέτει γνώση της τεχνικής, εξάσκηση και εμπειρία. Τα αναφερόμενα ποσοστά επιπλοκών είναι 0,35% και θνητότητας 0,0006%. Η διάτρηση εμφανίζεται σε ποσοστό 0,1-0,2% και η αιμορραγία σε ποσοστό 0,09%.